

Số: 2178/SYT-NVY

An Giang, ngày 12 tháng 8 năm 2019

V/v sử dụng phương pháp vô cảm
gây tê vùng trong mổ lấy thai

Kính gửi:

- Bệnh viện Sản Nhi An Giang;
- Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh;
- Bệnh viện đa khoa khu vực Tân Châu;
- Trung tâm Y tế huyện, thành phố;
- Bệnh viện Bình Dân, Hạnh Phúc, Nhật Tân.

Thực hiện Công văn số 4519/BYT-BM-TE ngày 06/08/2019 của Bộ Y tế về việc sử dụng phương pháp vô cảm gây tê vùng trong mổ lấy thai.

Nhằm giảm thiểu các tai biến dẫn tới tử vong của sản phụ, sơ sinh liên quan đến gây tê vùng. Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1. Không áp dụng phương pháp vô cảm gây tê vùng trong các trường hợp sản phụ có nhau tiền đạo thể trung tâm hoặc bán trung tâm, nhau bong non, nhau cài răng lược, dọa vỡ tử cung, sản giật, suy thai cấp, mổ lấy thai cấp cứu, có rối loạn đông máu, có bệnh lý nhiễm trùng toàn thân, có tăng áp lực nội sọ, bệnh lý tim mạch.

2. Cần nhắc năng lực cán bộ, điều kiện cấp cứu và đánh giá kỹ tình trạng người bệnh khi áp dụng phương pháp vô cảm gây tê vùng ở các trường hợp sản phụ có tiền sản giật. Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa bác sĩ sản khoa và bác sĩ gây mê hồi sức. Sản phụ cần được bác sĩ gây mê hồi sức khám kỹ trước khi áp dụng phương pháp vô cảm, chuẩn bị sẵn sàng cho các tình huống cấp cứu có thể xảy ra.

3. Tuân thủ các quy trình, quy định chuyên môn kỹ thuật, đặc biệt các quy trình theo dõi, chăm sóc và xử trí các tai biến sản khoa trong và ngay sau đẻ nhằm đảm bảo an toàn cao nhất cho người bệnh.

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BGĐ Sở Y tế;
- Lưu: VT, NVY.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trịnh Hữu Thọ

